

# 計量経済学 補足資料

## – 最小2乗パラメータ推定値の導出 –

河田 正樹

2006年10月23日

### 単純回帰モデル

$$Y_i = a + bX_i + u_i$$

の回帰係数(パラメータともいう)の推定値を最小2乗法によって求めることは、実績値( $Y_i$ )から予測値( $\hat{Y}_i$ )を引いた残差 $e_i$ の2乗和を最小にするような $\hat{a}, \hat{b}$ を求めることである。

予測値は

$$\hat{Y}_i = \hat{a} + \hat{b}X_i$$

となるので、残差の2乗和(これを $G$ とあらわす)は、

$$G = (Y_1 - \hat{a} - \hat{b}X_1)^2 + (Y_2 - \hat{a} - \hat{b}X_2)^2 + \cdots + (Y_n - \hat{a} - \hat{b}X_n)^2$$

となる(テキスト55ページ(2-26)式)。

### 平方完成による導出

テキスト85ページ付録(3)にあるように、カッコの中を次のように変形する。

$$\begin{aligned} Y_1 - \hat{a} - \hat{b}X_1 &= (Y_1 - \bar{Y}) - \hat{b}(X_1 - \bar{X}) + (\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a}) \\ &= y_1 - \hat{b}x_1 + (\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a}) \end{aligned}$$

すると、Gは

$$\begin{aligned} G &= \{(y_1 - \hat{b}x_1) + (\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a})\}^2 + \cdots + \{(y_n - \hat{b}x_n) + (\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a})\}^2 \\ &= \{(y_1 - \hat{b}x_1)^2 + 2(y_1 - \hat{b}x_1)(\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a}) + (\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a})^2\} \\ &\quad + \cdots + \{(y_n - \hat{b}x_n)^2 + 2(y_n - \hat{b}x_n)(\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a}) + (\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a})^2\} \\ &= (y_1 - \hat{b}x_1)^2 + \cdots + (y_n - \hat{b}x_n)^2 \\ &\quad + 2(y_1 - \hat{b}x_1)(\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a}) + \cdots + 2(y_n - \hat{b}x_n)(\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a}) \\ &\quad + (\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a})^2 + \cdots + (\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a})^2 \\ &= (y_1 - \hat{b}x_1)^2 + \cdots + (y_n - \hat{b}x_n)^2 \\ &\quad + (\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a})\{2(y_1 - \hat{b}x_1) + \cdots + 2(y_n - \hat{b}x_n)\} \\ &\quad + n(\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a})^2 \end{aligned}$$

となる。ここで、

$$(\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a})\{2(y_1 - \hat{b}x_1) + \cdots + 2(y_n - \hat{b}x_n)\} = 2(\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a})(y_1 + \cdots + y_n) \\ - 2\hat{b}(\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a})(x_1 + \cdots + x_n)$$

は、 $(y_1 + \cdots + y_n) = 0, (x_1 + \cdots + x_n) = 0$  より 0 となる（付録（1）参照）ので、

$$G = (y_1 - \hat{b}x_1)^2 + \cdots + (y_n - \hat{b}x_n)^2 + n(\bar{Y} - \hat{b}\bar{X} - \hat{a})^2$$

となる（テキスト 55 ページ（2-27）式）。 $G$  を最小にするような  $\hat{a}$  を考えると、

$$\hat{a} = \bar{Y} - \hat{b}\bar{X}$$

となる。このとき、（2-27）式の最後の項は 0 となるので、 $G$  を最小にする  $\hat{b}$  を求めるには、

$$(y_1 - \hat{b}x_1)^2 + \cdots + (y_n - \hat{b}x_n)^2$$

を最小にする  $\hat{b}$  を求めれば良い。この式は  $\hat{b}$  の 2 次式と見ることができ、平方完成によって最小値をとる  $\hat{b}$  が求められる。

$ax^2 + bx + c$  を最小にする  $x$  を求めるとき、 $a(x - \frac{b}{2a})^2 + \cdots$  という変形によって  $x = \frac{b}{2a}$  のとき最小値をとることがわかる。これが平方完成である。（2-29）式を変形すると

$$(y_1 - \hat{b}x_1)^2 + \cdots + (y_n - \hat{b}x_n)^2 = (y_1^2 - 2\hat{b}x_1y_1 + \hat{b}^2x_1^2) + \cdots + (y_n^2 - 2\hat{b}x_ny_n + \hat{b}^2x_n^2) \\ = (x_1^2 + \cdots + x_n^2)\hat{b}^2 - 2(x_1y_1 + \cdots + x_ny_n)\hat{b} + (y_1^2 + \cdots + y_n^2) \\ = (x_1^2 + \cdots + x_n^2)\{\hat{b} - \frac{(x_1y_1 + \cdots + x_ny_n)}{(x_1^2 + \cdots + x_n^2)}\}^2 + \cdots$$

よって、求める  $\hat{b}$  は

$$\hat{b} = \frac{(x_1y_1 + \cdots + x_ny_n)}{(x_1^2 + \cdots + x_n^2)} = \frac{S_{xy}}{S_x^2}$$

となる。

## 偏微分による導出

偏微分は高校で学んだ微分を 2 变数以上の場合に拡張したものであり、微分する变数以外の变数はすべて定数とみなしたものである。微分は曲線のある点における傾きを表すものであるから、

$$\text{微分が } 0 \text{ に等しい} = \text{傾きが } 0 = \text{最小値}$$

となる。よって、偏微分したものが 0 に等しいような  $\hat{a}, \hat{b}$  が、求める推定値である。

残差平方和  $G$  は

$$G = (Y_1 - \hat{a} - \hat{b}X_1)^2 + \cdots + (Y_n - \hat{a} - \hat{b}X_n)^2$$

となるので、 $\hat{a}$  で偏微分すると

$$\frac{\partial G}{\partial \hat{a}} = -2(Y_1 - \hat{a} - \hat{b}X_1) - \cdots - 2(Y_n - \hat{a} - \hat{b}X_n) \\ = -2\{(Y_1 - \hat{a} - \hat{b}X_1) + \cdots + (Y_n - \hat{a} - \hat{b}X_n)\} \quad (1)$$

また  $G$  を  $\hat{b}$  で偏微分すると

$$\begin{aligned}\frac{\partial G}{\partial \hat{b}} &= -2X_1(Y_1 - \hat{a} - \hat{b}X_1) - \cdots - 2X_n(Y_n - \hat{a} - \hat{b}X_n) \\ &= -2\{X_1(Y_1 - \hat{a} - \hat{b}X_1) + \cdots + X_n(Y_n - \hat{a} - \hat{b}X_n)\}\end{aligned}\quad (2)$$

(1) 式の  $\{\}$  内を  $= 0$  とし、 $\hat{a}$  の項と  $X_i$  の項を右辺に移行すると、

$$Y_1 + \cdots + Y_n = n\hat{a} + \hat{b}(X_1 + \cdots + X_n) \quad (3)$$

(2) 式の  $\{\}$  内を  $= 0$  とし、展開した  $X_i$  の項と  $X_i^2$  の項を右辺に移行すると、

$$X_1Y_1 + \cdots + X_nY_n = \hat{a}(X_1 + \cdots + X_n) + \hat{b}(X_1^2 + \cdots + X_n^2) \quad (4)$$

(3) 式に  $(X_1 + \cdots + X_n)$  をかけたものと、(4) 式を  $n$  倍したものを比べると、

$$(X_1 + \cdots + X_n)(Y_1 + \cdots + Y_n) = n\hat{a}(X_1 + \cdots + X_n) + \hat{b}(X_1 + \cdots + X_n)^2 \quad (5)$$

$$n(X_1Y_1 + \cdots + X_nY_n) = n\hat{a}(X_1 + \cdots + X_n) + n\hat{b}(X_1^2 + \cdots + X_n^2) \quad (6)$$

(5) 式から (6) 式を引くと

$$(X_1 + \cdots + X_n)(Y_1 + \cdots + Y_n) - n(X_1Y_1 + \cdots + X_nY_n) = \hat{b}\{(X_1 + \cdots + X_n)^2 - n(X_1^2 + \cdots + X_n^2)\}$$

となる。よって  $\hat{b}$  は

$$\begin{aligned}\hat{b} &= \frac{(X_1 + \cdots + X_n)(Y_1 + \cdots + Y_n) - n(X_1Y_1 + \cdots + X_nY_n)}{(X_1 + \cdots + X_n)^2 - n(X_1^2 + \cdots + X_n^2)} \\ &= \frac{-\frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)(Y_1 + \cdots + Y_n) + (X_1Y_1 + \cdots + X_nY_n)}{-\frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)^2 + (X_1^2 + \cdots + X_n^2)}\end{aligned}$$

となる。ところで、

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n) \\ \bar{Y} &= \frac{1}{n}(Y_1 + \cdots + Y_n)\end{aligned}$$

を (7) 式に代入すると、

$$\hat{b} = \frac{-n\bar{X}\bar{Y} + (X_1Y_1 + \cdots + X_nY_n)}{-n\bar{X}^2 + (X_1^2 + \cdots + X_n^2)}$$

よって  $\hat{b}$  の最小 2 乗パラメータ推定値は

$$\hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_x^2}$$

となる。また  $\hat{a}$  の最小 2 乗パラメータ推定値は (3) 式を  $\hat{a}$  についてとくと

$$\begin{aligned}\hat{a} &= \frac{1}{n}(Y_1 + \cdots + Y_n) - \hat{b}\frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n) \\ &= \bar{Y} - \hat{b}\bar{X}\end{aligned}$$

となる。これが  $\hat{a}$  の最小 2 乗パラメータ推定値である。